

UDRUŽENJE MATEMATIČARA TUZLANSKOG KANTONA

IRACIONALNE JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE

Dr. sc. MEHMED NURKANović, vanredni profesor

*SEMINAR ZA PROFESORE MATEMATIKE SREDNJIH ŠKOLA
TUZLANSKOG KANTONA*

Ormanica, 31.10.2009.

Sadržaj

1	Iracionalne jednađbe	1
2	Iracionalne nejednađbe	11
	Literatura	17

Poglavlje 1

Iracionalne jednađbe

Praksa pokazuje da su iracionalne jednađbe najkompliciranije od svih jednađbi elementarne algebre. Naime, razlog za to je nepostojanje općeg postupka za njihovo rješavanje. Tako je moguće riješiti samo neke jednostavne tipove iracionalnih jednađbi, dok je pokušaj bilo kakve klasifikacije tih jednađbi prema načinu rješavanja relativno vrlo složen. Zbog toga ćemo ovdje posebnu pažnju posvetiti problemu rješavanja tih jednađbi.

Definicija 1 *Jednađba u kojoj se nepoznanica javlja i pod korijenom naziva se **iracionalnom jednađbom**.*

Korijen se u tom slučaju uzima samo kao aritmetički.

Osnovni metod za rješavanje iracionalnih jednađbi je metod eliminacije korijena. Taj metod se sastoji u tome da se jednađba algebarskim transformacijama (prije svega stepenovanjem) svede na jednađbu u kojoj se nepoznanice ne pojavljuju pod znakom korijena. Međutim, stepenovanje ne dovodi uvijek do ekvivalentne jednađbe, već do jednađbe koja je samo posljedica polazne.

Primjer 1 *a) Jednađba $\sqrt{x} = -1$ nema rješenja (u skupu realnih brojeva), ali se nakon kvadriranja dobije $x = 1$.*

b) $\sqrt{x} = x - 2 \Rightarrow x = x^2 - 4x + 4 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow (x = 1 \vee x = 4)$. Provjerom ustanovimo da $x = 1$ nije rješenje polazne jednađbe, već samo $x = 4$.

a) *Iracionalne jednađbe s neparnim korijenima*

Pri rješavanju ovakvih jednađbi (da bismo se "oslobodili" korijena) koristimo se sljedećim teoremom:

Teorem 1 *Jednadžbe*

$$f(x) = g(x) \quad i \quad f^n(x) = g^n(x)$$

su ekvivalentne za neparan broj n ($n \in \mathbb{N}$).

Kada se radi s iracionalnim jednadžbama s trećim korijenima ili korijenima višeg reda, postupak racionalizacije (tj. oslobađanja od korijena) obično dovodi vrlo složenih jednadžbi. Zbog toga se one često rješavaju određenim smjenama ili nekim drugim 'trikovima'. Sljedeća dva primjera to dobro ilustriraju, ali i pokazuju da se procesom racionalizacije ne dobija uvijek niz ekvivalentnih jednadžbi.

Primjer 2 *Riješiti jednadžbu*

$$\sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{6+x} = 3. \tag{1.1}$$

Rješenje. Definiciono područje ovdje je cio skup realnih brojeva. Koristeći identitet

$$(a+b)^3 = a^3 + 3ab(a+b) + b^3, \tag{1.2}$$

nakon stepenovanja date jednadžbe s tri, dobijamo

$$\begin{aligned} (1.1) &\Leftrightarrow 3-x + 3\sqrt[3]{(3-x)(6+x)} \underbrace{\left(\sqrt[3]{3-x} + \sqrt[3]{6+x}\right)}_{\stackrel{(1.1)}{=} 3} + 6+x = 27 \\ &\Leftrightarrow \sqrt[3]{(3-x)(6+x)} = 2 \Leftrightarrow (3-x)(6+x) = 2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Leftrightarrow (x=2 \vee x=-5). \end{aligned}$$

Budući da smo u prvom koraku izvršili zamjenu zbira dva kubna korijena brojem 3 (prema(1.1)), obavezno treba izvršiti provjeru dobijenih vrijednosti za x , tj. da li zadovoljavaju polaznu jednadžbu. Ovdje je to zadovoljeno. ♣

Primjer 3 *Riješiti jednadžbu*

$$\sqrt[3]{x+1} + \sqrt[3]{3x+1} = \sqrt[3]{x-1}. \tag{1.3}$$

Rješenje. Analogno prethodnom primjeru, imamo

$$\begin{aligned} (1.3) &\Leftrightarrow x+1 + 3\sqrt[3]{(x+1)(3x+1)} \underbrace{\left(\sqrt[3]{x+1} + \sqrt[3]{3x+1}\right)}_{\stackrel{(1.3)}{=} \sqrt[3]{x-1}} + 3x+1 = x-1 \\ &\Rightarrow 3\sqrt[3]{(x+1)(3x+1)(x-1)} = -3x-3 \\ &\Leftrightarrow (x^2-1)(3x+1) = -(x+1)^3 \\ &\Leftrightarrow x^2(x+1) = 0 \Leftrightarrow (x=0 \vee x=-1). \end{aligned}$$

Iracionalne jednađbe i nejednađbe

Neposrednim uvrštavanjem ovih vrijednosti u datu jednađbu zaključujemo da je samo $x = -1$ njeno rješenje. Postavlja se pitanje: u čemu se razlikuju ove dvije jednađbe, bolje rečeno u čemu je razlika u rješavanju tih jednađbi kada je korišten isti metod? Odgovor je zasnovan na činjenici da smo u prvom slučaju opći izraz predstavljen lijevom stranom jednađbe zamijenili brojem, a u drugom ponovo novim izrazom (uočite da je u drugom koraku ovog primjera stavljen znak $'\Rightarrow'$ a ne znak ekvivalencije \Leftrightarrow), te nismo dobili niz ekvivalentnih jednađbi). ♣

b) Iracionalne jednađbe s parnim korijenima

U slučaju iracionalne jednađbe u kojoj se pojavljuju parni korijeni treba voditi računa o definicionom području te jednađbe, to jest o skupu dopustivih vrijednosti nepoznanice za koje su nenegativne sve potkorpene veličine parnih korjenova. O tome nam govori sljedeći teorem.

Teorem 2 Za paran broj n jednađbe

$$f(x) = g(x) \quad i \quad f^n(x) = g^n(x)$$

su ekvivalentne u oblasti u kojoj je

$$f(x) \geq 0 \quad i \quad g(x) \geq 0,$$

ili

$$f(x) < 0 \quad i \quad g(x) < 0.$$

Specijalno,

$$\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g^2(x), \\ g(x) \geq 0. \end{cases}$$

Izraz $f(x)$ pod korijenom treba da je nenegativan (tj. $f(x) \geq 0$), što je automatski zadovoljeno, jer je

$$f(x) = g^2(x) \geq 0.$$

Primjer 4 Riješiti jednađbu $x + 1 = \sqrt{x + 7}$.

Rješenje. Prema prethodnom teoremu imamo

$$\begin{aligned} x + 1 &= \sqrt{x + 7} \Leftrightarrow ((x + 1)^2 = x + 7 \wedge x + 1 \geq 0) \\ &\Leftrightarrow [(x = 2 \vee x = -3) \wedge x \geq -1] \Leftrightarrow x = 2. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Primjer 5 Riješiti jednađbu

$$\sqrt{2x + 1} + \sqrt{x - 3} = 4.$$

Rješenje. $DP : (2x + 1 \geq 0 \wedge x - 3 \geq 0) \Leftrightarrow x \geq 3$

Budući da je lijeva strana date nejednadžbe nenegativna, ona se smije kvadrirati, naravno za one vrijednosti nepoznanice koje zadovoljavaju DP . Dakle, data nejednadžba je, uz uvjet DP , ekvivalentna sa

$$\begin{aligned} 2x + 1 + x - 3 + 2\sqrt{(2x + 1)(x - 3)} &= 16 \Leftrightarrow 2\sqrt{(2x + 1)(x - 3)} = 18 - 3x \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 18 - 3x \geq 0 \\ 4(2x + 1)(x - 3) = (18 - 3x)^2 \end{cases} \end{aligned}$$

Prema tome, data nejednadžba je ekvivalentna sa

$$(x = 4 \vee x = 84 \wedge x \geq 3 \wedge x \leq 6) \Leftrightarrow x = 4. \quad \clubsuit$$

Istaknimo da su posebno komplicirane **iracionalne jednadžbe s parametrima**. Ilustriramo to sljedećim primjerima.

Primjer 6 *Diskutirati rješenje jednadžbe*

$$\sqrt{x^2 - p} + 2\sqrt{x^2 - 1} = x, \quad (1.4)$$

gdje je p realni parametar.

Rješenje. $DP : x^2 - p \geq 0 \wedge x^2 - 1 \geq 0$, pa razlikujemo sljedeće slučajeve

$$i) p \leq 1 \Rightarrow DP : x \in \langle -\infty, -1] \cup [1, +\infty),$$

$$ii) p > 1 \Rightarrow DP : x \in \langle -\infty, -\sqrt{p}] \cup [\sqrt{p}, +\infty)$$

No, uočimo sljedeće: $L \geq 0 \Rightarrow D = x \geq 0$ (L označava lijevu stranu, a D desnu stranu date jednadžbe), pa zbog toga i zbog DP u obzir dolaze sljedeće vrijednosti za x :

$$p \leq 1 \Rightarrow x \in [1, +\infty), \quad (1.5)$$

$$p > 1 \Rightarrow x \in [\sqrt{p}, +\infty). \quad (1.6)$$

Uz uvjete (1.5) ili (1.6) imamo:

$$\begin{aligned} (1.4) \Leftrightarrow x^2 - p + 4x^2 - 4 + 4\sqrt{(x^2 - p)(x^2 - 1)} &= x^2 \\ \Leftrightarrow 4\sqrt{(x^2 - p)(x^2 - 1)} &= p + 4 - 4x^2 \end{aligned} \quad (1.7)$$

Desna strana posljednje jednadžbe (1.7) mora biti nenegativna, to jest mora biti

$$x^2 \leq \frac{p + 4}{4}. \quad (1.8)$$

Iracionalne jednačbe i nejednačbe

Uz uvjete (1.8) i (1.5) imamo

$$\begin{aligned}(1.7) \quad &\Leftrightarrow 16(x^2 - p)(x^2 - 1) = p^2 + 8p + 16 - 8(p + 4)x^2 + 16x^4 \\ &\Leftrightarrow 8(2 - p)x^2 = (p - 4)^2 \Leftrightarrow x^2 = \frac{(p - 4)^2}{8(2 - p)},\end{aligned}$$

odakle neposredno slijedi da mora biti $p \leq 2$. Provjerimo sada uvjet (1.5):

$$\begin{aligned}x^2 \leq \frac{p + 4}{4} &\Leftrightarrow \frac{(p - 4)^2}{8(2 - p)} \leq \frac{p + 4}{4} \Leftrightarrow 3p^2 - 4p \leq 0 \\ &\Leftrightarrow p \in \left[0, \frac{4}{3}\right].\end{aligned}$$

Zbog toga preostaje provjeriti još samo uvjete (1.5) i (1.6) za $p \in \left[0, \frac{4}{3}\right]$:

$$\begin{aligned}p \leq 1 &\Rightarrow \left(x^2 \geq 1 \Leftrightarrow \frac{(p - 4)^2}{8(2 - p)} \geq 1 \Leftrightarrow p^2 \geq 0\right), \\ p \in \left\langle 1, \frac{4}{3}\right] &\Rightarrow \left(x^2 \geq p \Leftrightarrow \frac{(p - 4)^2}{8(2 - p)} \geq p \Leftrightarrow (3p - 4)^2 \geq 0\right),\end{aligned}$$

što je zadovoljeno.

$$\text{Rezultat: } x = \frac{4 - p}{2\sqrt{2}(2 - p)} \text{ za } p \in \left[0, \frac{4}{3}\right]. \quad \clubsuit$$

Primjer 7 *Diskutirati rješenje jednačbe*

$$\sqrt{x - 2} = x + a$$

u ovisnosti o realnom parametru a .

Rješenje. Jasno je da treba biti $x \geq 2$ i $x \geq -a$. Razlikujemo dva slučaja:

$$-a < 2, \text{ tj. } a > -2: \quad x \geq 2 \quad (1.9)$$

i

$$-a \geq 2, \text{ tj. } a \leq -2: \quad x \geq -a. \quad (1.10)$$

Uz te uvjete data jednačba je ekvivalentna sa

$$\begin{aligned}x - 2 &= x^2 + 2ax + a^2 \Leftrightarrow x^2 + (2a - 1)x + a^2 + 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x_{\pm} = \frac{1}{2}(1 - 2a \pm \sqrt{-4a - 7}).\end{aligned}$$

Odavdje slijedi da data jednađba nema rješenja kada je $-4a - 7 < 0$, to jest kada je $a > -\frac{7}{4}$. U slučaju kada je $a = -\frac{7}{4}$, polazna jednađba ima rješenje $x = \frac{9}{4}$. U preostalom slučaju, kada je $a < -\frac{7}{4}$, imamo da je $x_{\pm} \in \mathbb{R}$. Treba vidjeti samo kada te vrijednosti zadovoljavaju uvjete (1.9) i (1.10).

$$i) a \in \left\langle -2, -\frac{7}{4} \right\rangle$$

U ovom slučaju imamo

$$x_+ \geq 2 \Leftrightarrow \sqrt{-4a - 7} \geq 3a + 2,$$

što je za sve promatrane vrijednosti od a zadovoljeno (naime, $3a + 2 \leq 0$, za sve $a \in \left\langle -2, -\frac{7}{4} \right\rangle$), pa je x_+ rješenje date jednađbe. Također,

$$x_- \geq 2 \Leftrightarrow -3a - 2 \geq \sqrt{-4a - 7} \Leftrightarrow (a + 4)^2 \geq 0$$

$$(\text{jer je } -3a - 2 \leq 0 \text{ za } a \in \left\langle -2, -\frac{7}{4} \right\rangle),$$

što je uvijek zadovoljeno, pa je i x_- rješenje.

$$ii) a \in \langle -\infty, -2 \rangle$$

U ovom slučaju imamo

$$x_+ \geq -a \Leftrightarrow 1 + \sqrt{-4a - 7} \geq 0,$$

što je očito uvijek zadovoljeno, pa je x_+ rješenje date jednađbe. Također,

$$x_- \geq -a \Leftrightarrow 1 \geq \sqrt{-4a - 7} \Leftrightarrow a \geq -2,$$

što nije tačno, pa x_- nije rješenje.

Rezime:

1. za $a \in \langle -\infty, -2 \rangle$ jednađba ima jedinstveno rješenje $x_+ = \frac{1-2a+\sqrt{-4a-7}}{2}$;
2. za $a \in \left\langle -2, -\frac{7}{4} \right\rangle$ jednađba ima dva rješenja $x_{\pm} = \frac{1}{2} (1 - 2a \pm \sqrt{-4a - 7})$;
3. za $a \in \left\langle -\frac{7}{4}, +\infty \right\rangle$ jednađba nema rješenja. ♣

Već smo ranije napomenuli da se iracionalne jednađbe s trećim, četvrtim itd. korijenima vrlo često rješavaju određenim smjenama. Sljedeći primjer nam pokazuje kako se u određenim situacijama dobro odabranim smjenama iracionalna jednađba može efikasno riješiti.

Iracionalne jednačbe i nejednačbe

Primjer 8 *Riješiti jednačbu*

$$\sqrt[4]{47-2x} + \sqrt[4]{35+2x} = 4.$$

Rješenje. $DP : x \in \left[-\frac{35}{2}, \frac{47}{2}\right]$. Uvedimo smjene: $u = \sqrt[4]{47-2x}, v = \sqrt[4]{35+2x}$.

Tako dobijamo sljedeći sistem jednačbi

$$\begin{aligned}u^4 + v^4 &= 82, \\u + v &= 4.\end{aligned}$$

Transformacijom lijeve strane prve jednačbe, te uvođenjem smjene $t = uv$, dobijamo

$$\begin{aligned}u^4 + v^4 &= (u^2 + v^2)^2 - 2u^2v^2 = \left[(u+v)^2 - 2uv\right]^2 - 2u^2v^2 \\&= (16 - 2t)^2 - 2t^2,\end{aligned}$$

odnosno dobijamo kvadratnu jednačbu

$$t^2 - 32t + 87 = 0,$$

s rješenjima $t_1 = 3, t_2 = 29$.

Na taj način dobijamo sljedeća dva sistema jednačbi

$$\begin{cases} u + v = 4, \\ uv = 3, \end{cases} \quad \text{i} \quad \begin{cases} u + v = 4, \\ uv = 29. \end{cases}$$

Rješenja prvog sistema su uređeni parovi $(1, 3)$ i $(3, 1)$, odakle slijedi $x_1 = -17, x_2 = 23$. Drugi sistem nema realnih rješenja. Uočimo da oba rješenja pripadaju definicionom području date jednačbe, tako da su to ujedno njena rješenja. ♣

○ ○ ○

Zadaci za samostalan rad

Riješiti sljedeće jednačbe:

- $\sqrt[3]{x+45} - \sqrt[3]{x-16} = 1.$
- $\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{2x-3} = \sqrt[3]{12(x-1)}.$

$$3. \sqrt[3]{2x+17} - \sqrt[3]{2x-37} = 6.$$

$$4. \sqrt[3]{4x^2+10x+4} + \sqrt[3]{2x^2-5x-3} = \sqrt[3]{2x+1}.$$

$$5. x - \sqrt[3]{x^2-x-1} = 1.$$

$$6. \sqrt[3]{\frac{x+3}{5x+2}} + \sqrt[3]{\frac{5x+2}{x+3}} = \frac{13}{6}.$$

$$7. \sqrt[5]{\frac{16x}{x-1}} + \sqrt[5]{\frac{x-1}{16x}} = \frac{5}{2}.$$

$$8. x + \sqrt{1-15x} = 3.$$

$$9. a) \sqrt{x+2} + \sqrt{x+7} = 5,$$

$$b) \sqrt{x+4} + \sqrt{x+11} = 7.$$

$$10. \sqrt{2x+14} - \sqrt{x+5} = \sqrt{x-7}.$$

$$11. \sqrt{x^2+4x+8} + \sqrt{x^2+4x+4} = \sqrt{2(x^2+4x+6)}.$$

$$12. \frac{x + \sqrt{x^2-1}}{x - \sqrt{x^2-1}} + \frac{x - \sqrt{x^2-1}}{x + \sqrt{x^2-1}} = 34.$$

$$13. \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2+2} = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+1}}.$$

$$14. \sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x-\sqrt{x}} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}}.$$

$$15. \sqrt{3x^2+5x-8} - \sqrt{3x^2+5x+1} = 1.$$

$$16. a) \sqrt[4]{97-x} + \sqrt[4]{x} = 5.$$

$$b) \sqrt[4]{629-x} + \sqrt[4]{77+x} = 8.$$

Diskutirati rješenja sljedećih jednačbi u ovisnosti o parametru $a \in \mathbb{R}$:

Iracionalne jednadžbe i nejednadžbe

17. $\sqrt{2-x} = -\frac{x}{2} + a.$

18. $\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x-\sqrt{x}} = (a+1) \sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}}.$

19. $\sqrt{1+\sqrt{x}} + \sqrt{1-\sqrt{x}} = a.$

20. $\sqrt{a+x} + \sqrt{a-x} = x.$

Poglavlje 2

Iracionalne nejednadžbe

Definicija 2 *Nejednadžba u kojoj se nepoznanica nalazi i pod korijenom zove se iracionalna nejednadžba.*

Problematika rješavanja iracionalnih nejednadžbi slična je problematici rješavanja iracionalnih jednadžbi. Zbog toga su i metodi za njihovo rješavanje dosta slični, ali ima i bitnih razlika o kojima itekako valja voditi računa. Tu se prije svega misli na poteškoće koje se javljaju kao rezultat množenja nejednadžbe negativnim brojem, što prouzrokuje promjenu smisla nejednakosti. Naročito je opasno izvoditi neoprezno i nekritički množenje nejednadžbe brojnim izrazom u kojem figurira nepoznanica. Zato se preporučuje da se to nikad i ne radi, osim u slučaju kada za brojni izraz znamo da je pozitivan ili negativan za sve dozvoljene vrijednosti nepoznanice. S druge strane, posebnu pažnju moramo posvetiti i kvadriranju date nejednadžbe u cilju oslobađanja od kvadratnog korijena. To se smije raditi samo u slučaju kada su i lijeva i desna strana nejednadžbe nenegativne. Da je kvadriranje nedozvoljeno u slučaju kad su obje strane nejednadžbe negativne pokazuje sljedeći primjer: ako tačnu nejednakost $-4 < -2$ kvadiramo, dobit ćemo nejednakost $16 < 4$, koja je netačna. Prema tome, treba strogo voditi računa o sljedećem pravilu:

$$(L < D \wedge L \geq 0 \wedge D \geq 0) \Leftrightarrow L^2 < D^2. \quad (2.1)$$

Pri tome se nejednakost $<$ može zamijeniti bilo kojom od nejednakosti: $>$, \geq ili \leq .

Ako se ne držimo ovog pravila, mogu nastupiti različite problematične situacije. Pokazuje nam to sljedeći jednostavni primjer.

Primjer 9 *Riješiti sljedeće nejednadžbe:*

$$a) \sqrt{x} < 2; \quad b) \sqrt{x} < -2; \quad c) \sqrt{x} > 2; \quad d) \sqrt{x} > -2.$$

Rješenje. Uočimo da je definiciono područje svake od nejednadžbi $x \geq 0$.

a) Obje strane ove nejednadžbe su nenegativne, pa se može primijeniti gornje pravilo kvadriranja nejednadžbe, nakon čega dobijemo $x < 4$. Uzimajući u obzir definiciono područje, vidimo da mora biti $x \in [0, 4)$ i to je traženi skup rješenja nejednadžbe.

b) Desna strana nejednadžbe je negativan broj, pa se ne smije kvadrirati. No, budući da je lijeva strana nejednadžbe nenegativna, jasno je da taj broj ne može biti manji od negativnog broja na desnoj strani. Dakle, u ovom slučaju nejednadžba nema rješenja.

c) Kao i u slučaju a) smijemo kvadrirati nejednadžbu, nakon čega dobijemo $x > 4$. Upoređujući to s DP , dobijamo skup rješenja nejednadžbe $\langle 4, +\infty \rangle$.

d) Ni ovdje ne smijemo kvadrirati nejednadžbu, jer je desna strana negativna. Kako je, međutim, lijeva strana nenegativna, ona je uvijek veća od desne strane. Zato je skup rješenja skup svih vrijednosti nepoznanice koje zadovoljavaju DP , tj. $x \in [0, +\infty)$. ♣

Vrlo je bitno promatrati sljedeća četiri tipa iracionalnih nejednadžbi:

$${}^{2n}\sqrt{f(x)} < g(x), \quad {}^{2n}\sqrt{f(x)} > g(x), \quad {}^{2n+1}\sqrt{f(x)} < g(x), \quad {}^{2n+1}\sqrt{f(x)} > g(x) \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (2.2)$$

Posljednja dva tipa su jednostavna, dok su prva dva kompliciranija i zato obratimo posebnu pažnju na njih.

U prvoj nejednadžbi je $DP : f(x) \geq 0$ i lijeva strana je nenegativna. Zbog navedenog pravila kvadriranja nejednakosti (2.1) i stroge nejednakosti desna strana nejednadžbe mora biti pozitivna, tj. $g(x) > 0$. Uz ta dva uvjeta, nakon stepenovanja sa $2n$, dobijamo $f(x) < [g(x)]^{2n}$. Dakle, vrijedi sljedeći teorem.

Teorem 3 *Nejednadžba*

$${}^{2n}\sqrt{f(x)} < g(x) \quad (n \in \mathbb{N})$$

ekvivalentna je sistemu nejednadžbi i to:

$${}^{2n}\sqrt{f(x)} < g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < [g(x)]^{2n} \\ f(x) \geq 0 \\ g(x) > 0. \end{cases}$$

Primjer 10 *Riješiti nejednadžbu $\sqrt{x^2 - 5x + 4} < x - 3$.*

Rješenje. Prema prethodnom teoremu imamo

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - 5x + 4} < x - 3 &\Leftrightarrow [0 \leq x^2 - 5x + 4 < (x - 3)^2 \wedge x - 3 > 0] \\ &\Leftrightarrow \{x \in \langle -\infty, 1 \rangle \cup [4, +\infty) \wedge x < 5 \wedge x > 3\} \\ &\Leftrightarrow x \in [4, 5). \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Iracionalne jednačbe i nejednačbe

I u drugoj nejednačbi u (2.2) je $DP : f(x) \geq 0$ i lijeva strana je nenegativna. Ovdje su moguća dva slučaja: da je desna strana negativna ili da je nenegativna. Ako je $g(x) < 0$, tada je rješenje svako x iz DP . Dakle, u ovom slučaju skup rješenja R_1 nejednačbe ima oblik

$$R_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq 0 \wedge g(x) < 0\}.$$

Ako je $g(x) \geq 0$, tada smijemo nejednačbu spepenovati sa $2n$, jer su joj obje strane nenegativne, pa dobijamo $f(x) > [g(x)]^{2n}$. Uočimo da je uvjet DP u ovom slučaju automatski ispunjen, budući da je $f(x) > [g(x)]^{2n} \geq 0$, za sve realne vrijednosti nepoznanice x . Prema tome, u ovom slučaju skup rješenja R_2 nejednačbe je predstavljen skupom

$$R_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > [g(x)]^{2n} \wedge g(x) \geq 0\}.$$

Na taj način dobijamo skup rješenja R nejednačbe kao $R = R_1 \cup R_2$, a što se može iskazati i sljedećim teoremom.

Teorem 4 Za nejednačbu oblika

$$\sqrt[2n]{f(x)} > g(x) \quad (n \in \mathbb{N})$$

vrijedi

$$\sqrt[2n]{f(x)} > g(x) \Leftrightarrow \left(\left\{ \begin{array}{l} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{array} \right\} \vee \left\{ \begin{array}{l} f(x) > [g(x)]^{2n} \\ g(x) \geq 0 \end{array} \right\} \right).$$

Primjer 11 Riješiti nejednačbu $\sqrt{1-4x^2} \geq 1-3x$.

Rješenje. Koristeći prethodni teorem imamo

$$\begin{aligned} \sqrt{1-4x^2} \geq 1-3x &\Leftrightarrow \left(\left\{ \begin{array}{l} 1-4x^2 \geq 0 \\ 1-3x < 0 \end{array} \right\} \vee \left\{ \begin{array}{l} 1-4x^2 > (1-3x)^2 \\ 1-3x \geq 0 \end{array} \right\} \right) \\ &\Leftrightarrow \left(\left\{ \begin{array}{l} -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ x > \frac{1}{3} \end{array} \right\} \vee \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq x \leq \frac{6}{13} \\ x \leq \frac{1}{3} \end{array} \right\} \right) \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{1}{3} < x \leq \frac{1}{2} \vee 0 \leq x \leq \frac{1}{3} \right) \Leftrightarrow x \in \left[0, \frac{1}{2} \right]. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Primjer 12 Riješiti nejednačbu

$$\sqrt{x - \frac{1}{x}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x}} > \frac{x-1}{x}.$$

Rješenje. DP: $\left(x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x} \geq 0 \wedge \frac{x - 1}{x} \geq 0\right) \Leftrightarrow x \in [-1, 0) \cup [1, +\infty)$.

Za takve $x \in DP$, desna strana nejednadžbe je nenegativna, pa rješenje nejednadžbe postoji ako je lijeva strana nejednadžbe pozitivna, tj. ako je

$$\sqrt{x - \frac{1}{x}} > \sqrt{1 - \frac{1}{x}},$$

što je zadovoljeno za $x > 1$. Uz taj uvjet data nejednadžba je ekvivalentna sa

$$\begin{aligned} (x^2 + x + 1 > 2x\sqrt{x+1} \wedge x > 1) &\Leftrightarrow [(x^2 - x - 1)^2 > 0 \wedge x > 1] \\ &\Leftrightarrow x > 1 \wedge x \neq \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \quad \clubsuit \end{aligned}$$

Za posljednja dva tipa iracionalnih nejednadžbi iz (2.2), tj. za nejednadžbe s neparnim korijenima vrijede sljedeće tvrdnje.

Teorem 5 *Nejednadžba oblika*

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} < g(x) \quad (n \in \mathbb{N})$$

ekvivalentna je nejednadžbi

$$f(x) < [g(x)]^{2n+1}.$$

Nejednadžba oblika

$${}^{2n+1}\sqrt{f(x)} > g(x) \quad (n \in \mathbb{N})$$

ekvivalentna je nejednadžbi

$$f(x) > [g(x)]^{2n+1}.$$

I ovdje moramo istaknuti da su posebno komplicirane **iracionalne nejednadžbe s parametrima**. Ilustriraćemo to sljedećim primjerom.

Primjer 13 *Diskutiarti rješenje nejednadžbe*

$$2\sqrt{x+a} > x+1$$

u ovisnosti o realnom parametru a.

Iracionalne jednačbe i nejednačbe

Rješenje. Prema Teoremu 4 imamo

$$\begin{aligned} 2\sqrt{x+a} > x+1 &\Leftrightarrow \left(\begin{cases} x+a \geq 0 \\ x+1 < 0 \end{cases} \vee \begin{cases} 4(x+a) > (x+1)^2 \\ x+1 \geq 0 \end{cases} \right) \\ &\Leftrightarrow \left(\begin{cases} x \geq -a \\ x < -1 \end{cases} \vee \begin{cases} x^2 - 2x + 1 - 4a < 0 \\ x \geq -1 \end{cases} \right) \end{aligned}$$

Kako je $x^2 - 2x + 1 - 4a < 0 \Leftrightarrow x \in \langle 1 - 2\sqrt{a}, 1 + 2\sqrt{a} \rangle$ za $a > 0$, dok za $a \leq 0$ sledi $x \in \emptyset$. Za ostale vrijednosti parametra a imamo sljedeće slučajeve.

i) Za $0 < a \leq 1$, sistem nejednačbi $x \geq -a \wedge x < -1$ nema rješenja, dok je

$$\left\{ \begin{array}{l} x^2 - 2x + 1 - 4a < 0 \\ x \geq -1 \end{array} \right\} \Leftrightarrow x \in \langle 1 - 2\sqrt{a}, 1 + 2\sqrt{a} \rangle,$$

što i predstavlja skup rješenja R nejednačbe za ove vrijednosti parametra a .

ii) Za $a > 1$ imamo

$$\begin{aligned} (x \geq -a \wedge x < -1) &\Leftrightarrow x \in [-a, -1), \\ &\vee \\ \left\{ \begin{array}{l} x^2 - 2x + 1 - 4a < 0 \\ x \geq -1 \end{array} \right\} &\Leftrightarrow x \in [-1, 1 + 2\sqrt{a}), \end{aligned}$$

odakle se dobija skup rješenja R nejednačbe za promatrane vrijednosti parametra a :

$$R : x \in [-a, 1 + 2\sqrt{a}). \quad \clubsuit$$

o o o

Zadaci za samostalan rad

Riješiti sljedeće nejednačbe:

1. a) $\sqrt{4x+10} < 2x+1$,

b) $\sqrt{x+7} < x+1$.

2. a) $\sqrt{2x+1} > x-1$,

b) $\sqrt{x-1} > x-3$.

3. a) $x > \sqrt{x^2 - 3x + 2}$,

b) $\sqrt{x^2 - 55x + 250} < x - 14$.

4. $\sqrt{x+1} < \sqrt{2x-4}$.

5. $\sqrt{x-6} + \sqrt{1-x} \leq \sqrt{2x-1}$.

-
6. $\sqrt{5x+4} + \sqrt{5x-4} > \sqrt{10x-6}$.
7. $\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} > 2$.
8. $\sqrt{\frac{x}{x-2}} - \sqrt{\frac{x-2}{x}} > \frac{1}{x}$.
9. $\sqrt{x^2-8x+15} + \sqrt{x^2+2x-15} > \sqrt{4x^2-18x+18}$.
10. $\frac{1-\sqrt{1-8x^2}}{2x} < 1$.

Diskutirati rješenja sljedećih nejednadžbi u ovisnosti o parametru $a \in \mathbb{R}$:

11. $\sqrt{a^2-x^2} + \sqrt{2ax-x^2} > a, \quad (a \in \mathbb{R})$.
12. $a\sqrt{x+1} < 1$.
13. $\sqrt{x-1} \geq a-x$.
14. $\sqrt{a-x} + \sqrt{a+x} > a$.
15. $\sqrt{a+\sqrt{x}} + \sqrt{a-\sqrt{x}} < \sqrt{2}$.
16. $\sqrt{a+x} - \sqrt{\frac{a^2}{a+x}} < \sqrt{2a+x}$.

Bibliografija

- [1] M. Nurkanović, Z. Nurkanović, *Zbirka zadataka iz matematike - za pripremanje prijemnih ispita na fakultetima* (drugo izdanje), Ekonomski fakultet Tuzla, Tuzla, 1997.
- [2] Nurkanović, Z. Nurkanović, *Elementarna matematika - Teorija i zadaci*, (u pripremi), Tuzla, 2009.